

RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS
EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2015, DE 15 DE JULHO DE 2015
AUTARQUIA DE LEBON RÉGIS/SC
CONCURSO PÚBLICO

Inscrição	Cargo	Questão	Solicitação																									
1843	TECNICO EM ENFERMAGEM	04	Contra Gabarito																									
Situação:	INDEFERIDO																											
Justificativa:	<p>Levando-se em conta os recursos recebidos referentes à questão nº 04, afirmar-se: A interpretação da pergunta é parte essencial para o sucesso do candidato, na questão o enunciado é claro no qual trata-se de um diagnóstico, nesse caso, supostamente a cliente está realizando um dos exames citados no enunciado, onde, pressupõe que o resultado já seja previamente esperado.</p> <p>Segundo BRASIL (2013, p. 31), Tabela 3 – Valores preconizados para o diagnóstico de DM tipo 2 e seus estágios pré-clínicos:</p> <p style="text-align: center;">Tabela 3 – Valores preconizados para o diagnóstico de DM tipo 2 e seus estágios pré-clínicos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #4F81BD; color: white;">Categoria</th> <th style="background-color: #4F81BD; color: white;">Glicemia de jejum*</th> <th style="background-color: #4F81BD; color: white;">TTG: duas horas após 75 g de glicose</th> <th style="background-color: #4F81BD; color: white;">Glicemia casual**</th> <th style="background-color: #4F81BD; color: white;">Hemoglobina glicada (HbA1C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Glicemia normal</td> <td><110</td> <td><140</td> <td><200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Glicemia alterada</td> <td>>110 e <126</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tolerância diminuída à glicose</td> <td></td> <td>≥140 e <200</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diabetes mellitus</td> <td>≥126</td> <td>≥ 200</td> <td>200 (com sintomas clássicos***)</td> <td>>6,5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fonte: Adaptado de Sociedade Brasileira de Diabetes, 2009; World Health Organization (2006). *O jejum é definido como a falta de ingestão calórica por, no mínimo, oito horas. **Glicemia plasmática casual é definida como aquela realizada a qualquer hora do dia, sem se observar o intervalo desde a última refeição. ***Os sintomas clássicos de DM incluem poliúria, polidipsia e polifagia.</p> <p>BRASIL, Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica : diabetes mellitus. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso. Gabarito mantido.</p>			Categoria	Glicemia de jejum*	TTG: duas horas após 75 g de glicose	Glicemia casual**	Hemoglobina glicada (HbA1C)	Glicemia normal	<110	<140	<200		Glicemia alterada	>110 e <126				Tolerância diminuída à glicose		≥140 e <200			Diabetes mellitus	≥126	≥ 200	200 (com sintomas clássicos***)	>6,5%
Categoria	Glicemia de jejum*	TTG: duas horas após 75 g de glicose	Glicemia casual**	Hemoglobina glicada (HbA1C)																								
Glicemia normal	<110	<140	<200																									
Glicemia alterada	>110 e <126																											
Tolerância diminuída à glicose		≥140 e <200																										
Diabetes mellitus	≥126	≥ 200	200 (com sintomas clássicos***)	>6,5%																								

Inscrição	Cargo	Questão	Solicitação
1689	TECNICO EM ENFERMAGEM	06	Contra Gabarito
Situação:	DEFERIDO		
Justificativa:	<p>Levando-se em conta o recurso recebido referente à questão nº 06, e considerando a divergência entre literaturas, DEFERE-SE o recurso, optando-se pela anulação da questão e pontuando-se para todos os candidatos concorrentes ao cargo.</p>		

Publica-se em

Joaçaba, 04 de Setembro de 2015